




中華民國中醫師公會全國聯合會
Taiwan Chinese Medical Association

<會務快訊> -- 2022/06/28



陳瑩：清冠一號預算短絀 「中醫藥司始料未及」
不應要民眾來承擔

清冠一號擬調整公費對象 陳瑩籲指揮中心維持
補助



中華民國中醫師公會全國聯合會新聞稿

發稿日期：民國 111 年 6 月 24 日星期五

發稿單位：公共關係室

連絡電話：0920-883738 蔡三郎秘書長

0912-361395 陳博淵副秘書長

0918-260616 郭哲彰副秘書長

0912-762964 黃科峯主任委員

不應限縮確診民眾使用 「臺灣清冠一號」公費補助

- 一、鑑於「臺灣清冠一號」對於新冠肺炎有顯著療效，並在此次疫情中扮演舉足輕重的角色，不僅讓確診者加速康復、重拾健康，且能大幅降低染疫後的症狀反應，而諸多幼兒在接受「臺灣清冠一號」的治療後，也都獲得立即改善，是以地方政府如彰化衛生局等，更是直接派案，將確診民眾轉介給中醫院所視訊診療給藥，相關新聞報導亦不勝枚舉，顯見「中醫醫療效果」與「臺灣清冠一號」對於臺灣新冠疫情趨緩，功不可沒。
- 二、當前臺灣疫情已逐漸獲得控制，然而「公費臺灣清冠一號」對於大多數民眾仍有極大助益，不宜貿然退場，本會建議應持續公費清冠一號補助，深信對於安定民心、紓解民眾染疫後的憂慮、促進社會生活正常化，均有正面的良效。倘若防疫醫療費用不足，爰建議以公費補助清冠一號者的條件也應擴及高風險族群：
 - 1、具任一「重症風險因子」的確診輕症民眾，例如：發熱、咽痛、咳嗽等確診病人。
 - 2、上述輕症症狀兼具有「喘症」的中症確診病人。
 - 3、12歲以下的輕、中症確診兒童。

有關「重症風險因子」包括：年齡 65 歲以上、65 歲以下 BMI $\geq$ 30、懷孕、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺病、結核病、慢性肝病、失能、失智症、吸菸、免疫功能等疾病者。

三、臺灣中醫對新冠肺炎確診民眾，均能有一定療效或避免衍生後遺症，最重要的是，中醫治療相對副作用低，若民眾因特殊體質、年齡條件而有臨床需求者，中醫師還能加用「科學中藥」輔助治療；此外，如確診病人經中醫師評估不適合使用「臺灣清冠一號」，中醫師仍可依照臨床「辨、證、論、治」使用科學中藥或傳統水煎劑進行救治，絕對不會遺漏任何一個需要幫助的民眾。

四、敦請衛生福利部體察臺灣民眾需求，延續政府德政，讓更多人民受惠！

中華民國中醫師公會全國聯合會



理事長 **柯富揚**

※ [PDF 中醫全聯會新聞稿：不應限縮確診民眾使用「臺灣清冠一號」公費補助](#)

※ [澄清「13 至 64 歲新冠肺炎確診者臺灣清冠一號 7 月起改自費」之報導](#)

※ [清冠一號 13 歲至 64 歲確診者須自費購買？陳時中：還沒有定案](#)

※ 最新政策資訊



- ※ [Novavax 一週後開打！QA 秒看 3 大優勢 「可接種對象」曝](#)
- ※ [兒童染疫累計 49 萬例 長新冠占整體 5%](#)
- ※ [BA.4 BA.5 境外增 61 例 指揮中心：不須延長隔離](#)
- ※ [確診又破 4 萬例「下降沒想像快」，8 月恐再爆 BA.4、BA.5 疫情...Novavax 最快 7/14 接種](#)
- ※ [6/28 本土 4 萬 4379 例、180 例中重症 MIS-C 增 1 歲童年紀最小個案\[影\]](#)
- ※ [18 歲以上可混打 Novavax 疫苗 擴大 4 類對象打第 4 劑](#)
- ※ [Omicron 變異株 BA.4、BA.5 累計 126 例 無本土病例](#)
- ※ [快訊 / 今增 91 死！本土+28489「近 2 個月確診新低」](#)
- ※ [7 / 15 起國旅振興啟動 符合「這些條件」爽折抵 1300 元](#)
- ※ [蔡總統：提升疫苗覆蓋率 穩健邁向疫後正常生活](#)
- ※ [學生確診累計破 34 萬例 3661 校暫停實體課](#)
- ※ [6/26 本土 3 萬 9586 例 增 134 例死亡、359 例中重症](#)

- ※ [COVID-19 / 復發、重複感染、後遺症、長新冠差在哪裡？一次看懂染疫後不同情況代表的意義](#)
- ※ [請各位醫師，治療確診後之患者，以 ICD10 病名碼為主診斷碼，U09.9 新冠後遺症設為『次』診斷碼](#)
[再次提醒 U09.9 新冠後遺症設為『次』診斷碼](#)
- ★ [中醫全聯會函轉衛福部健保署新增 ICD-10-CM 代碼 U09.9](#)

ACIP專家會議COVID-19疫苗接種建議

1/3

6個月至5歲幼兒莫德納 COVID-19疫苗接種建議

- 目前國內處於社區流行階段，建議6個月至5歲幼童接種莫德納 COVID-19疫苗接種，以降低染疫後重症及死亡之風險
- 經參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4-8週以上。

5-11歲兒童COVID-19疫苗基礎加強劑及追加劑接種建議

- 對於免疫不全及免疫力低下且病情穩定者建議接種基礎加強劑(與第二劑間隔28天後接種)
- 對於完整接種基礎劑對象，建議於滿5個月(150天)後，接種追加劑。

2022/06/27

中央流行疫情指揮中心

ACIP專家會議COVID-19疫苗接種建議

2/3

機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員第二次追加劑接種建議

- 建議機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員接種第2次追加劑
- 建議2劑間隔**5個月**以上

Novavax COVID-19疫苗接種建議

- 建議使用於18歲以上民衆接種基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑
- 可與其他廠牌交替使用

2022/06/27

中央流行疫情指揮中心

ACIP專家會議COVID-19疫苗接種建議

3/3

COVID-19確診者疫苗接種建議

- 無論先前是否具 SARS-CoV-2感染史，建議應依各廠牌應接種劑次，完成 COVID-19 疫苗基礎劑及追加劑接種
- 依據現有有限資料顯示，延長SARS-CoV-2感染後接種COVID-19疫苗之間隔，可增加接種疫苗後誘發之免疫保護力，且感染後短期間重複感染機率較低，爰建議確診者可自發病日或確診日(無症狀感染者)起3個月且無急性症狀後，接種 COVID-19 疫苗
- 確診者若已無急性症狀且符合解隔條件，如符合下列情形，可經醫師評估適直接種後，完成尚未完成之COVID-19疫苗劑次：
 - ◆ 因工作需求、工作性質等原因導致感染風險可能增加
 - ◆ 免疫力/免疫功能低下導致感染風險增加
 - ◆ 因應入境其他國家時疫苗接種紀錄查核之需

2022/06/27

中央流行疫情指揮中心

猴痘是什麼？

- ★ 人畜共通病毒感染，潛伏期約為5-21天，通常為6-13天
- ★ 症狀包括發燒、畏寒/寒顫、出汗、頭痛、肌肉痛、淋巴腺腫大、極度倦怠、皮疹
- ★ 發燒1至3天後出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延致身體其他部位，四肢比軀幹更常見。皮膚病灶出現後會依斑疹、丘疹、水泡、膿疱階段變化，最終結痂脫落。症狀可能持續14至21天

主要傳播方式

- ★ 直接接觸感染猴痘的動物
- ★ 直接接觸到病患的呼吸道分泌物、損傷的皮膚或黏膜、被污染的物品
- ★ 飛沫傳播需在長時間面對面接觸情境下較容易發生

2022/06/27

疾病管制署

猴痘的預防及照護

疫苗與治療照護

- ★ **不建議大規模接種猴痘疫苗**，國際間通常建議高暴露風險職業或高感染風險之密切接觸者可接種疫苗
- ★ 大多數病患的**不需特殊治療**，必要時，可提供輸液治療與維持營養等支持性療法，以減輕症狀和併發症
- ★ 目前有數種藥物可用於治療，但僅建議**嚴重病患或免疫低下者**使用

預防方法

- ★ 前往猴痘病毒動物流行地區時，**避免接觸齧齒動物和靈長類動物及生病或死亡動物**，所有食物必須澈底煮熟後才能食用
- ★ **避免與猴痘病患接觸**，或接觸時應佩戴適當防護裝備
- ★ 如有任何疑似症狀，應及時就醫，並**告知旅遊史與接觸史**

2022/06/27

疾病管制署

入境日介於2022/6/10-6/18

新增**61**例邊境攔截Omicron BA.4及BA.5境外移入病例

旅遊國家	Omicron BA.4	Omicron BA.5	合計
美國	6+3	16+13	38
德國	0	9+6	15
西班牙	0	5+1	6
新加坡	2	4+4	10
泰國	2	3+2	7
土耳其	0	3+2	5
英國	1	1+3	5
澳洲	1	1	2
日本	0	1+1	2
韓國	0	1+1	2
越南	0	1	1
波蘭	0	1+1	2
匈牙利	0	1	1
法國	1	3+6	10
南非	0	1	1
薩爾瓦多	0	1	1
智利	1	0	1
馬來西亞	1	1+1	3
瑞士	0	1	1
阿拉伯聯合大公國	1	1	2
丹麥	0	2	2
奈及利亞	0	1	1
荷蘭	0	1	1
印尼	0	1	1
印度	0	1	1
比利時	0	1	1
挪威	0	1	1
沙烏地阿拉伯	0	1	1
肯亞	0	1	1
調查中	0	1	1
總計	11+8	54+53	126

累計邊境攔截Omicron BA.4 19例、BA.5 107例，共126例

2022/06/27

中央流行疫情指揮中心

本土中/重症及死亡個案說明

新增93例重症(其中82例死亡)/另已公布個案中17例中症轉重症及死亡/4例重症轉死亡

103例死亡個案

註：DNR：不施行心肺復甦術

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
≥90	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	男	無	心肺衰竭、新冠確診	無慢性病史
≥90	男	3劑	肺炎併心臟衰竭	心血管疾病等；DNR
≥90	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等；DNR
≥90	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症
≥90	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	高血壓等
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	女	3劑	肺炎併敗血性休克	神經系統疾病等
≥90	女	2劑	肺炎、泌尿道感染	糖尿病等；DNR
≥90	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
≥90	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
≥90	女	3劑	肺炎、泌尿道感染	中風等；DNR
≥90	女	無	肺炎併心肺衰竭	中風等
≥90	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
≥90	男	無	心肺衰竭、新冠確診	癌症等
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等
80+	女	3劑	肺炎併敗血性休克	中風等；DNR
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等；DNR
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病
80+	男	無	肺炎、菌血症併多重器官衰竭	慢性腎病等
80+	女	無	新冠病毒感染併多重器官衰竭	心血管疾病等
80+	男	1劑	肺炎併敗血症	慢性腎病等
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等
80+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
80+	男	3劑	肺炎、泌尿道感染	糖尿病
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等；DNR
80+	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等；DNR
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等；DNR
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
80+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
80+	男	3劑	肺炎併多重器官衰竭	神經系統疾病等
80+	男	3劑	肺炎併心肺衰竭、泌尿道感染	癌症等；DNR
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等；DNR
80+	男	無	心肺衰竭、新冠確診	慢性肺病等
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
80+	女	無	心肺衰竭、新冠確診	糖尿病等
80+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
80+	男	3劑	心肌梗塞併多重器官衰竭、肺炎	心血管疾病
80+	女	2劑	心肺衰竭、新冠確診	高血壓等；DNR
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等
80+	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症；DNR
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR
80+	女	3劑	心肺衰竭、新冠確診	心血管疾病等
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等；DNR
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
80+	女	無	肺炎併敗血症	慢性腎病
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等；DNR
70+	男	1劑	肺炎併心肺衰竭	心血管疾病等；DNR
70+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	高血壓；DNR
70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
70+	女	無	肺炎併敗血性休克	心血管疾病等；DNR
70+	女	3劑	新冠確診、急性肝衰竭、泌尿道感染	風濕免疫疾病等

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病；DNR
70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病
70+	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
70+	女	1劑	癌症、肺炎	癌症等
70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
70+	男	無	肺炎併敗血性休克、泌尿道感染	心血管疾病等
70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR
70+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	中風
70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等
70+	男	無	心肺衰竭、新冠確診	高脂血症等
70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	有慢性病史(調查中)
70+	男	2劑	肺炎、癌症	癌症等；DNR
70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
70+	男	2劑	肺炎併心肺衰竭	糖尿病等
70+	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭、心肌梗塞	中風等
70+	男	無	心肺衰竭、新冠確診	慢性腎病等
70+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
60+	女	3劑	肺炎併心臟衰竭	糖尿病等
60+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等
60+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病
60+	男	2劑	肺炎併心肺衰竭	心血管疾病等
60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等
60+	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等；DNR
60+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等
60+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	高血壓
60+	女	3劑	糖尿病等	高血壓
60+	男	無	細菌性肺炎併多重器官衰竭	糖尿病
60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等
50+	男	3劑	心肺衰竭、新冠確診	無慢性病史
50+	男	無	癌症、缺血性腸阻塞、新冠確診	癌症等；DNR
50+	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	慢性腎病等
50+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症
50+	男	無	急性心肌梗塞、新冠確診	心血管疾病等
50+	女	3劑	新冠確診、出血性腦中風	中風
50+	男	2劑	肺炎併心肺衰竭	糖尿病等
40+	男	2劑	心肺衰竭、新冠確診	糖尿病等
40+	男	無	感染性心內膜炎併敗血性休克、肺炎	糖尿病
30+	男	3劑	細菌性肺炎併呼吸衰竭、新冠肺炎重症	肝硬化等；DNR

特殊重症個案

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
<5	男	無	孩童多系統炎症徵候群(MIS-C) (病況好轉已出院)	無慢性病史

新增180例中重症個案(中症87例、重症93例)

年齡	中症	重症	疫苗接種	中症	重症
≥90歲	9	15	未接種	42	32
80-89歲	22	35	1劑	6	9
70-79歲	22	22	2劑	12	15
60-69歲	17	12	3劑以上	27	37
40-59歲	8	8			
20-39歲	2	0			
10-19歲	1	0			
<10歲	6	1			

2022/06/28

中央流行疫情指揮中心

本土中/重症及死亡個案說明

新增85例重症(其中68例死亡)/另已公布個案中19例中症轉重症及死亡/4例重症轉死亡

91例死亡個案

註：DNR：不施行心肺復甦術

年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註	年齡	性別	疫苗	染疫病程/共病重點	備註
≥90	女	無	心肺衰竭、新冠確診	神經系統疾病	70+	女	無	肺炎併呼吸衰竭、腸胃道出血	有慢性病史(調查中)
≥90	男	1劑	肺炎併敗血症	無慢性病史	70+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症
≥90	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等	70+	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	糖尿病等
≥90	女	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等	70+	男	3劑	心肺衰竭、新冠確診	神經系統疾病
≥90	女	無	肺炎併心肺衰竭	慢性腎病等	70+	男	3劑	肺炎併心肺衰竭	糖尿病等
≥90	女	無	心肺衰竭、新冠確診	慢性肝炎等	70+	女	無	肺炎併敗血症性休克	慢性腎病
≥90	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史	70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	有慢性病史(調查中)
≥90	女	2劑	肋膜積水、新冠確診	神經系統疾病	70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	心律不整
≥90	男	無	肺炎併心肺衰竭	高血壓等	70+	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等；DNR
≥90	男	1劑	肺炎併心肺衰竭	心血管疾病等	70+	男	2劑	癌症、腎衰竭、肺炎	癌症等
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
≥90	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	高血壓等	70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
≥90	女	無	肺炎併敗血症	慢性肺病等；DNR	70+	女	3劑	肺炎、泌尿道感染併心肺衰竭	慢性腎病
≥90	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等	70+	男	3劑	硬腦膜下出血、新冠確診	心血管疾病等
≥90	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	有慢性病史(調查中)	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	股骨骨折；DNR	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等
≥90	男	無	肺炎併敗血症	神經系統疾病；DNR	70+	女	3劑	肺炎、心肌梗塞	心血管疾病等
≥90	男	無	心衰竭、腦梗塞、新冠確診	心血管疾病等	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史；DNR
≥90	男	3劑	心肺衰竭、新冠確診	有慢性病史(調查中)	70+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	無慢性病史
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等	70+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病
≥90	女	2劑	肺炎併呼吸衰竭、腸胃道出血	糖尿病等；DNR	60+	男	3劑	心血管疾病併心臟衰竭、新冠確診	慢性腎病等
≥90	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭、腸胃道出血	慢性腎病等；DNR	60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
≥90	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	顱內出血	60+	男	1劑	心肺衰竭、新冠確診	中風等
≥90	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR	60+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症等
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症等；DNR	60+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等；DNR
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等；DNR	60+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症轉移等；DNR
≥90	男	無	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等；DNR	60+	女	無	心肺衰竭、新冠確診	慢性肝炎
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	中風等	60+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR
80+	女	1劑	心肺衰竭、新冠確診	神經系統疾病	60+	男	無	肺炎併敗血症性休克	中風等；DNR
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等	50+	男	1劑	肺炎併呼吸衰竭	心血管疾病等
80+	女	3劑	肺炎併心肺衰竭	心血管疾病等	50+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	有慢性病史(調查中)
80+	男	無	肺炎併心肺衰竭	慢性腎病	50+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	癌症等；DNR
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	癌症	50+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	高血壓等
80+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等；DNR	50+	男	3劑	肺炎併敗血症性休克	癌症
80+	男	3劑	前列腺腫瘤併敗血症性休克、肺炎	神經系統疾病	50+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病
80+	女	無	肺炎併心肺衰竭	心血管疾病等	30+	女	1劑	心肺衰竭、新冠確診	神經系統疾病
80+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等					
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等					
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	糖尿病等					
80+	男	3劑	心肺衰竭、新冠確診	慢性腎病等					
80+	女	無	肺炎、癌症	癌症等					
80+	女	無	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等；DNR					
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等；DNR					
80+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	中風等；DNR					
80+	男	無	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等					
80+	女	無	肺炎併敗血症性休克	無慢性病史					
80+	男	3劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性肺病等					
80+	男	無	肺炎併敗血症性休克	癌症等；DNR					
80+	女	1劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病；DNR					
80+	男	3劑	肺炎、心肌炎	有慢性病史(調查中)					
80+	男	2劑	肺炎併呼吸衰竭	慢性腎病等					
70+	男	無	肺炎併心肺衰竭	癌症等					
70+	女	3劑	心肺衰竭、新冠確診	心血管疾病等					
70+	女	3劑	肺炎併呼吸衰竭	神經系統疾病等					
70+	女	無	肺炎併心肺衰竭	心血管疾病等					

新增205例中重症個案(中症120例、重症85例)

年齡	中症	重症
≥90歲	28	23
80-89歲	35	22
70-79歲	24	23
60-69歲	18	11
40-59歲	13	5
20-39歲	2	1
10-19歲	0	0
<10歲	0	0

疫苗接種	中症	重症
未接種	54	35
1劑	8	8
2劑	14	11
3劑以上	44	31

2022/06/27

中央流行疫情指揮中心

2022/01/01-06/27本土病例共3,612,885例分析

今日新增180例本土中重症以上個案及103例死亡個案(21例為先前已公布個案)。
(1-6月中重症15,266、其中5,595名死亡)。

輕症/無症狀

3,597,619人

99.58%

中重症

中症

8663+87-17人

0.24%

重症

6423+93+17人
(其中死亡：5492+103人)

0.18%

中重症(含死亡)病例
年齡/人數

中症：
未滿10歲 208+6人
10多歲 64+1人
20多歲 96人
30多歲 137+2人
40多歲 310+3-1人
50多歲 650+5人
60多歲 1313+17-1人
70多歲 1938+22-3人
80多歲 2648+22-9人
≥90歲 1299+9-3人

重症(其中5492+103人死亡)：
未滿10歲 60+1人
10多歲 20人
20多歲 32人
30多歲 60人
40多歲 177+1+1人
50多歲 395+7人
60多歲 901+12+1人
70多歲 1417+22+3人
80多歲 2057+35+9人
≥90歲 1304+15+3人

2022/06/28 中央流行疫情指揮中心

2022/06/28 公布 103 位確診死亡名單分析

病歷調查

97人

有癌症等重大疾病或慢性病史

6人

無癌症等重大疾病、慢性病史
無接種疫苗：2人
接種2劑疫苗：1人
接種3劑疫苗：3人

接種紀錄

60人

未打滿3劑疫苗

0劑 36人

1劑 10人

2劑 14人

3劑以上 43人

年齡分析

58人

年齡超過80歲

90歲以上 19人

(8人未打過疫苗)

80至89歲 39人

(15人未打過疫苗)

70至79歲 24人

(9人未打過疫苗)

60至69歲 11人

(1人未打過疫苗)

50至59歲 7人

(2人未打過疫苗)

40至49歲 2人

(1人未打過疫苗)

30至39歲 1人

(0人未打過疫苗)

中央流行疫情指揮中心

2022/06/28

COVID-19醫療資源統計表

編號	類型	地區	總床數	空床數	空床率
1	病床 (專責+負壓)	全國(227家)	13,508	6,928	51.3%
		臺北區(60家)	3,865	1,943	50.3%
		北區(28家)	1,596	877	54.9%
		中區(45家)	2,892	1,537	53.1%
		南區(33家)	1,859	729	39.2%
		高屏區(48家)	2,909	1,578	54.2%
		東區(13家)	387	264	68.2%
2	中央集中檢疫所(55家)		8,131	5,318	65.4%
3	地方加強型防疫旅館(48家)		4,533	2,199	48.5%

資料截止時間：2022/06/28 07:00

2022/06/28

中央流行疫情指揮中心

2022/01/01-06/26本土病例共3,584,401例分析

今日新增205例本土中重症以上個案及91例死亡個案(23例為先前已公布個案)。
(1-6月中重症15,086、其中5,492名死亡)。

輕症/無症狀

3,569,315人

99.58%

中重症

中症

8562+120-19人

0.24%

重症

6319+85+19人
(其中死亡：5401+91人)

0.18%

中重症(含死亡)病例
年齡/人數

中症：
未滿10歲 208人
10多歲 64人
20多歲 96人
30多歲 135+2人
40多歲 307+3人
50多歲 641+10-1人
60多歲 1297+18-2人
70多歲 1918+24-4人
80多歲 2619+35-6人
≥90歲 1277+28-6人
重症(其中5401+91人死亡)：
未滿10歲 60人
10多歲 20人
20多歲 32人
30多歲 59+1人
40多歲 177人
50多歲 389+5+1人
60多歲 888+11+2人
70多歲 1390+23+4人
80多歲 2029+22+6人
≥90歲 1275+23+6人

2022/06/27 中央流行疫情指揮中心

2022/06/27 公布 91 位確診死亡名單分析

病歷調查

86人

有癌症等重大疾病或慢性病史

5人

無癌症等重大疾病、慢性病史
無接種疫苗：2人
接種1劑疫苗：2人
接種3劑疫苗：1人

接種紀錄

59人

未打滿3劑疫苗

0劑 37人

1劑 10人

2劑 12人

3劑以上 32人

年齡分析

51人

年齡超過80歲

90歲以上 27人

(14人未打過疫苗)

80至89歲 24人

(8人未打過疫苗)

70至79歲 24人

(9人未打過疫苗)

60至69歲 9人

(3人未打過疫苗)

50至59歲 6人

(3人未打過疫苗)

30至39歲 1人

(0人未打過疫苗)

中央流行疫情指揮中心

2022/06/27

COVID-19醫療資源統計表


編號	類型	地區	總床數	空床數	空床率
1	病床 (專責+負壓)	全國(227家)	13,824	6,866	49.7%
		臺北區(59家)	3,974	2,023	50.9%
		北區(28家)	1,601	870	54.3%
		中區(46家)	3,056	1,478	48.4%
		南區(33家)	1,885	697	37.0%
		高屏區(48家)	2,921	1,538	52.7%
		東區(13家)	387	260	67.2%
2	中央集中檢疫所(55家)		8,131	5,363	66.0%
3	地方加強型防疫旅館(48家)		4,533	2,216	48.9%

資料截止時間：2022/06/27 07:00

2022/06/27

中央流行疫情指揮中心

口服抗病毒藥物每日領用情形



住宿式服務機構通報情形

機構類別	機構數 (1/1-6/26)	確診工作人員數 (1/1-6/26)	確診住民人數 (1/1-6/26)	中重症 送醫人數 (4/1-6/26)	確診個案送醫後死亡人數	
					新增 死亡人數 (6/20-6/26)	累計 死亡人數 (4/1-6/26)
長照	40	294	1,209	64	3	36
護理	314	3,368	12,034	1,291	103	406
精神照護/ 復健	165	628	3,662	108	5	13
社福	1,005	5,916	21,650	1,618	48	458
總計	1,524	10,206	38,555	3,081	159	913

(資料擷取時間2022/6/26 22:00)

2022/06/28

中央流行疫情指揮中心

住宿式機構 住宿式長照機構 一般護理之家 精神照護/復健機構 老人福利機構 確診住民投藥情形

6/20-6/26 確診機構住民為就地隔離安置/集中照護者，平均開藥率已提高至93%

機構類別	確診住民安置及給藥方式			住民確診至授予口服抗病毒藥物平均天數
	機構內就地隔離安置/集中照護人數 (A)	開立抗病毒藥物情形		
		小計		
		人數 (B)	比率(%) (C=B/A)	
住宿式長照機構	123	112	91	0
一般護理之家	1,542	1,410	91	0
老人福利機構	1,562	1,497	96	0
精神照護/復健機構	387	325	84	0
合計	3,614	3,344	93	0

住宿式機構確診住民投藥比率



2022/06/28

中央流行疫情指揮中心

管制措施 (二級資訊陸續更新)

[教育部](#)

[文化部](#) [衛生福利部](#)

[衛生福利部食品藥物管理署](#)

----- 新聞稿及醫界通函 -----

[新聞稿](#)

[醫界通函](#)

★★ [【疫情動態訊息】](#)

★★ [新冠肺炎延燒 疫情不斷更新](#)

★★ [各縣市確診個案公共場所活動史](#)

※ [COVID-19 民眾注意事項](#)

※ [COVID-19 確診個案居家照護管理指引](#)

※ [COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助](#)

※ [居家隔離](#)

※ [確診者分流收治原則及兒童之警訊表徵與送醫條件](#)

111/06/28 [今新增境外 049 例，本土 44379 例，103 例死亡](#)

111/06/27 [今新增境外 091 例，本土 28489 例，091 例死亡](#)

111/06/26 [今新增境外 060 例，本土 39586 例，134 例死亡](#)

111/06/25 [今新增境外 105 例，本土 40293 例，151 例死亡](#)

111/06/24 [今新增境外 089 例，本土 45678 例，152 例死亡](#)

★★★ [防疫速訊 11123 期 2022 年 06 月 09 日](#)

[防疫速訊 11122 期 2022 年 06 月 02 日](#)

<<[會務佈告欄舊資訊區](#) & [疫情舊資訊區](#)>>

[會務佈告欄 2022/06/26](#)

★註：文字點擊後會連結到相關的訊息頁面