



<會務快訊> -- 2022/09/07

恭賀 柯富揚理事長 再度獲聘為總統府國策顧問

感謝總統對於中醫藥的支持，富揚再度獲聘為總統府國策顧問，這也是總統對於中醫藥發展的重視跟肯定，接下來的五年中醫藥振興計畫我們要好好把握，再度讓中醫藥志業發光發熱，守護全民健康！

總統府公布遴聘及新聘資政、國策顧問名單新聞稿  
<https://www.president.gov.tw/News/26932>

※※ [《新聞思想啟》第 45 集-PART3 台灣抗疫路 中醫崛起！推清冠藥方 視訊看診成常態](#) ※※

<防疫快訊> -- 2022/09/07

※ [本土中/重症及死亡個案說明圖 0907](#) ※

※ [分析及統計 0907](#) ※

※ [COVID-19 疫情整理包](#)

※ [111 學年度第一學期各級學校開學防疫措施 PDF](#)

※ [不持久？打到第四劑變「疫苗疲乏」 羅一鈞揭保護力縮短最新數據](#)

※ [中秋連假過後「單日 5 萬例、染疫 500 萬人」 王必勝：有可能！](#)

- ※ 開學防疫新制 9/12 如期實施 教育部將密切留意疫情發展
- ※ 9/7 本土 4 萬 1021 例 增 26 死、104 例中重症 [0907](#)
- ※ 疫情走高 指揮中心估年底前增 200 多萬人確診
- ※ 旅遊業喊「開放 0+7」吸引觀光客 莊人祥：還有 3 關卡待解
- ※ 快訊 / 本土+36393「新北增 7795 例最多」 七縣市病例破千 [0906](#)
- ※ 美加紐澳歐洲與邦交國 9/12 起恢復免簽入境
- ※ 首例本土 BA.4 重複感染 北部男子確診近 2 個月再染疫
- ※ 王必勝重申：採購 BA.5 雙價疫苗「在考量內」 親曝疫苗過剩解方
- ※ 採購 BA.1 雙價疫苗遭批！張上淳拿「莫德納送審資料」澄清保護效力
- ※ 快訊 / 增一例 MIS-C！1 歲男童「三大指數升高」 冠狀動脈擴大
- ※ 醫稱 BA.5 潛伏期減為 2 天 羅一鈞：中位數仍為 3 天「沒有明顯縮短」
- ※ 9/5 本土 2 萬 3931 例 增 31 死、中重症 101 人[影][0905](#)
- ※ 莊人祥：9/6 至 9/7 單日確診可能破 4 萬例
- ※ 9/4 本土增 3 萬 4126 例、35 死 疫情較上週同期升溫近 3 成 [0904](#)
- ※ 日本入境指引修正 外國團客 9/7 起可自由行動
- ※ 莫德納次世代疫苗採購遭質疑 王必勝：BA.1 二價對 BA.5 也有效
- ※ 9/3 本土 3 萬 2529 例 增 42 死、140 例中重症[影][0903](#)

# COVID-19疫苗 第二次追加劑接種說明

## 以下對象建議接種

- ◆ 65歲以上長者 ◆ 長照機構住民
- ◆ 18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者，包括：
  - 目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療之癌症患者
  - 器官移植患者/幹細胞移植患者
  - 中度/嚴重先天性免疫不全患者
  - 洗腎患者
  - HIV陽性患者
  - 目前正使用高度免疫抑制藥物者
  - 過去6個月內接受化學治療或放射線治療者
  - 其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下，可接種基礎加強劑者

## 開放下列對象可評估自身染疫風險與意願接種

- ◆ 醫事人員(包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員)
- ◆ 機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員
- ◆ 機構與社福照護系統相關工作人員
- ◆ 50-64歲成人
- ◆ 18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者
- ◆ 接種間隔：與第一次追加劑間隔至少3個月以上(實施日期另行公布)
- ◆ 不論先前接種劑次廠牌，第二次追加劑可接種Moderna(50微克)、Novavax、高端或成人劑型BNT

註1.如曾接種前述疫苗後均發生過敏反應者，經醫師評估後，可接種AZ疫苗  
註2.確診者建議於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力

2022/09/06更新版

中央流行疫情指揮中心

# ACIP專家會議COVID-19疫苗接種建議

1/2

## 莫德納次世代雙價疫苗提供作為追加劑使用

- 第一階段：65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下者
- 第二階段：第一類醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人、18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者

追加劑與上一劑(包含：基礎劑最後一劑、基礎加強劑、第1次及第2次追加劑等)

接種間隔為至少3個月以上

(接種作業實施時間，將視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間另行公布)

2022/09/07更新  
中央流行疫情指揮中心



# ACIP專家會議COVID-19疫苗接種建議

2/2

建議調整追加劑接種間隔為與上一劑間隔至少3個月以上  
(包含現行單價及次世代雙價疫苗)

- 包含基礎劑最後一劑/基礎加強劑與第一次追加劑、第一次追加劑與第二次追加劑、第二次追加劑與第三次追加劑之間隔，確診後亦需間隔3個月後接種
- 12至17歲青少年追加劑接種間隔亦調整為與基礎劑最後一劑/基礎加強劑間隔至少3個月以上

Novavax COVID-19疫苗12至17歲青少年接種建議

- 接種2劑基礎劑，2劑間隔至少4週以上
- 建議以同製程疫苗完成基礎劑接種
- 可提供作為12至17歲青少年追加劑接種使用(可與基礎劑不同廠牌)

2022/09/06

中央流行疫情指揮中心

中秋、重陽佳節將至

## 機構住民請假外出防疫小提醒

依據現行「住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」

- 請假未外宿，原則不需篩檢
- 請假外宿，返回前7日內會有COVID-19暴露風險<sup>1</sup>者，需篩檢：
  - ① 出具返回前採檢之自費篩檢陰性證明<sup>2、3</sup>
  - ② 返回第3至4天及第7天，各1次自費篩檢<sup>2、3</sup>
  - ③ 返回次日起7天內避免參加團體活動<sup>2</sup>
- 鼓勵住民使用臺灣社交距離APP，於進入機構前出示該APP畫面

1. 暴露風險包括會接觸處於可傳染期之**確診/居家隔離/自主防疫/居家檢疫者**、或具有發燒或呼吸道症狀等疑似感染症狀者等情形。
2. 確診個案符合解隔離條件，且距發病日或採檢陽性日(無症狀者適用) 15天以上至3個月內，得免除各項篩檢。
3. 自費篩檢陰性證明包含抗原快篩或PCR，進入機構前之篩檢以當日抗原快篩為主，亦得使用前2日內採檢之PCR結果。使用家用試劑自行檢測或由醫事人員採檢檢測皆可。

2022/09/06

中央流行疫情指揮中心

## 莫德納雙價疫苗(原型株+BA.1)追加劑對Omicron BA.4/BA.5病毒株的中和抗體效價結果

	無論接種前是否曾經感染的受試者		接種前未曾感染SARS-CoV-2的受試者	
	雙價疫苗組	原型株疫苗組	雙價疫苗組	原型株疫苗組
接種追加劑前 Observed GMT (95% CI)	172.7 (147.4, 202.3)	209.3 (179.5, 244.1)	115.6 (98.5, 135.6)	139.7 (119.5, 163.3)
接種後第29天 Estimated GMT (95% CI)	<b>985.4</b> (914.8, 1061.4)	<b>588.4</b> (544.1, 636.2)	<b>776.4</b> (719.5, 837.9)	458.3 (420.6, 499.3)
GMR (95% CI)	<b>1.68</b> (1.52, 1.84)		<b>1.69</b> (1.51, 1.90)	

GMT: 中和抗體幾何平均效價, GMR: 中和抗體幾何平均效價比值

無論接種前是否曾經感染：雙價疫苗追加劑/原型株疫苗追加劑，對抗Omicron BA.4/BA.5之中和抗體幾何平均效價比值(GMR)為**1.68倍**

➤ 接種前未曾感染者：雙價疫苗追加劑/原型株疫苗追加劑 GMR 為**1.69倍**

2022/09/05-**更新版**

中央流行疫情指揮中心

## 歐洲藥品管理局及加拿大衛生部均建議 接種BA.1雙價疫苗因應疫情變化

歐洲藥品管理局建議：

- ◆ 已於今年9月1日核准緊急使用授權 (EUA) 莫德納與輝瑞/BNT的BA.1雙價疫苗
- ◆ 現有疫苗仍可預防現在或未來出現之COVID-19變種病毒，造成重症或死亡機率，呼籲仍應繼續接種現有疫苗
- ◆ 無法預測病毒未來將如何變異及流行哪些變異株，建議民衆不應等待針對特定變異株的次世代疫苗

加拿大衛生部建議：

- ◆ 已於今年9月1日核准莫德納BA.1雙價疫苗用於18歲及以上成人
- ◆ 莫德納BA.1雙價疫苗仍能對BA.4/BA.5變異株產生更強的免疫反應，且與原始莫德納疫苗相比，研究中無發現新的安全問題
- ◆ 另有專家們表示，BA.1疫苗對提高流行變種病毒株之免疫力非常重要，且考量可能需持續接種COVID-19疫苗，建議不應該等待完美和最新的疫苗

2022/09/05

中央流行疫情指揮中心




# mRNA單價疫苗於Omicron BA.4/BA.5流行期間 對於預防住院的保護效果

1/2

依美國11年9月1日公布「Updates on COVID-19 Vaccine Effectiveness during Omicron」資料顯示：

VISION: mRNA VE for hospitalizations among immunocompetent adults ≥18 years by number of doses and time since last dose receipt, late-Mar-late-Jul 2022



- 對於免疫功能正常之18歲以上成人於Omicron BA.4/BA.5流行期間對於預防住院之疫苗保護效果，於完成接種3劑(第一次追加劑)4個月(120天)內約為49%，接種4個月以上為34%。
- 另50歲以上成人於Omicron BA.4/BA.5流行期間對於預防住院之疫苗保護效果，於完成接種4劑(第二次追加劑)2個月(60天)內約為60%，接種2-4個月內為56%。

參考資料：美國CDC

<https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-09-01/04-COVID-Link-Gelles-508.pdf>

2022/09/05

中央流行疫情指揮中心


# mRNA單價疫苗於Omicron BA.4/BA.5流行期間 對於預防住院的保護效果

2/2

依美國11年9月1日公布「Updates on COVID-19 Vaccine Effectiveness during Omicron」資料顯示：

對於18歲以上免疫不全成人，於Omicron(任一變異株流行期間)預防住院之疫苗保護效果，於完成接種3劑3個月內約71%，3個月以上約41%。

VISION: mRNA VE for hospitalizations among immunocompromised adults ≥18 years by number of doses and time since last dose during Omicron predominance (all subvariants), mid-Dec 2021 – late-Jul 2022



參考資料：美國CDC

<https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-09-01/04-COVID-Link-Gelles-508.pdf>

2022/09/05

中央流行疫情指揮中心





## 次世代疫苗採購說明

- BA.1雙價疫苗對現在流行的病毒株確定有效，近期可到貨開打。
- BA.5雙價疫苗將於審查完成後購買，但目前時間尚未確定。
- 基於疫情升溫，建議符合接種條件之族群，可接種現有或預計本月開打之BA.1雙價疫苗。
- 指揮中心將持續綜合判斷各項因素，積極採購適合的疫苗供國人接種，亦會保留購買更新世代疫苗之彈性與空間。

2022/09/05

中央流行疫情指揮中心




## 嬰幼兒COVID-19疫苗 接種說明



廠牌	莫德納	Pfizer-BioNTech
對象	滿6個月至5歲 (未滿6歲) 嬰幼兒	滿6個月至 未滿5歲嬰幼兒
每次劑量	每劑25微克(mcg)	每劑3微克(mcg)
劑次	2	3
接種間隔	兩劑間隔4-8週以上	第1劑與第2劑間隔至少4週 第2劑與第3劑間隔至少8週
接種部位	2歲以下之嬰幼兒建議接種於大腿前外側股外側肌 2歲以上幼兒接種於非慣用手之上臂三角肌	

**建議以同一廠牌完成應接種劑次**

2022年14週-35週 COVID-19本土病例趨勢圖(4/3-9/3)



2022/09/05

中央流行疫情指揮中心



# 穩健開放、漸進調整邊境管制

9/12起，恢復以下國家國民入境免簽證待遇：  
美、加、紐、澳、歐洲與邦交國

## 相關邊境防疫與入境檢疫措施仍維持

- 入境人數總量上限維持每周5萬人
- 入境後必須接受唾液篩檢
- 入境檢疫維持3+4天

中央流行疫情指揮中心

2022/09/05

## 新增50例BA.5及1例BA.4本土個案分析

居住地	個案數		年齡層	個案數	
	BA.5	BA.4		BA.5	BA.4
北部	35	1	兒童/青少年	14	0
中部	8	0	成人	36	1
南部	5	0	總計	50	1
東部	2	0			
總計	50	1			

◆ 本週新增BA.4、BA.5本土個案均為無症狀/輕症

2022/09/05

中央流行疫情指揮中心

## 目前次世代疫苗採購策略

- 因應國內疫情升高，優先採購對Omicron (包括BA.4/BA.5)有效之BA.1雙價次世代疫苗。
- BA.1雙價次世代疫苗視施打狀況陸續進貨，並預留未來購買其他次世代疫苗空間。
- 持續關注BA.5雙價次世代疫苗發展，並請廠商提供相關資料進行審查，再依審查結果與廠商洽詢購買。

2022/09/03

中央流行疫情指揮中心

## BA.5雙價疫苗現況

- 主要基於動物試驗資料及BA.1臨床試驗佐證資料，通過美國FDA EUA。世界其他國家暫未採納。
  - 效果是否優於BA.1雙價？效果如何？目前難以確定，尚待更多臨床試驗結果佐證。
  - 迄今皆無資料供臺灣審核。
  - 據了解廠商暫時無法供貨給美國以外其他國家。
- ➔ 尚待廠商提供相關資料供食藥署審核  
較難確定何時可供疫苗

2022/09/03

中央流行疫情指揮中心

## COVID-19莫德納雙價次世代疫苗差異說明

	mRNA-1273.214	mRNA-1273.222
疫苗株	原型株+BA.1	原型株+BA.4/BA.5
送審相關試驗資料	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 第二/第三期臨床試驗</li> <li>• 動物試驗</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 動物試驗</li> <li>• BA.1臨床試驗佐證資料</li> </ul>
核准使用國家	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8/15 英國</li> <li>• 8/29 瑞士</li> <li>• 8/30 澳洲</li> <li>• 9/1 歐盟*、加拿大</li> <li>• 9/2 臺灣</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 8/31 美國</li> </ul>

\*歐盟人用藥品委員會(CHMP)建議核准

2022/09/03

中央流行疫情指揮中心

## 嬰幼兒接種後 要注意哪些副作用？

常見副作用多屬輕微，會在48小時內緩解，若發燒超過48小時，或出現右列症狀，請儘速就醫！



接種後28天內若疑似出現下列症狀，請立即就醫！



爸媽們一定要多注意寶目的反應喔！



## 管制措施 (二級資訊陸續更新)

[教育部](#)

[文化部](#) [衛生福利部](#)

[衛生福利部食品藥物管理署](#)

----- [新聞稿及醫界通函](#) ----- [新聞稿](#) [醫界通函](#)

### ★★ [【疫情動態訊息】](#)

★★ [新冠肺炎延燒 疫情不斷更新](#)

★★ [各縣市確診個案公共場所活動史](#)

※ [COVID-19 民眾注意事項](#)

※ [COVID-19 確診個案居家照護管理指引](#)

※ [COVID-19 確診個案分流收治與居家照護之醫療協助](#)

※ [居家隔離](#)

※ [確診者分流收治原則及兒童之警訊表徵與送醫條件](#)

[111/09/07 今新增境外 275 例，本土 41021 例，026 例死亡](#)

[111/09/06 今新增境外 314 例，本土 36393 例，021 例死亡](#)

[111/09/05 今新增境外 172 例，本土 23931 例，031 例死亡](#)

[111/09/04 今新增境外 232 例，本土 34126 例，035 例死亡](#)

[111/09/03 今新增境外 283 例，本土 32529 例，042 例死亡](#)

[111/09/02 今新增境外 336 例，本土 33483 例，036 例死亡](#)

★★★ [防疫速訊 11135 期 2022 年 09 月 01 日](#)

[防疫速訊 11134 期 2022 年 08 月 25 日](#)

<<[會務佈告欄舊資訊區](#) & [疫情舊資訊區](#)>>

[會務佈告欄 2022/09/02](#)

★註：文字點擊後會連結到相關的訊息頁面