

正本

檔 號
保存年限

中華民國中醫師公會 全國聯合會
114. 6. 26
收文第A2831號

衛生福利部 函

地址：115204 臺北市南港區忠孝東路6段488號

聯絡人：葉香吟

聯絡電話：(02)8590-7334

傳真：(02)8590-7088

電子郵件：mdime@mohw.gov.tw

220



新北市板橋區民生路一段33號11樓之2

受文者：中華民國中醫師公會全國聯合會

發文日期：中華民國114年6月23日

發文字號：衛部醫字第1141663919號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：辨識兒虐技巧(懶人包)請至附件下載區(<https://attach.mohw.gov.tw>)以文號：

1141663919及認證碼：991F4BC9F5下載附件檔案

主旨：為提升醫事人員對兒虐傷勢辨識敏感度與責任通報知能，檢送「兒少虐待及疏忽醫事人員工作手冊」（下載網址：<https://dep.mohw.gov.tw/DOMHAOH/cp-4265-45674-107.html>）及辨識兒虐技巧（懶人包）1份，請惠予納入相關教育訓練，並協助向會員宣導，及請積極參與本部兒少保護區域醫療整合中心相關教育訓練，請查照。

說明：

- 一、依據114年4月28日本部「家庭暴力及性侵害防治推動小組第6屆第5次會議」決議事項辦理。
- 二、副本抄送財團法人國家衛生研究院優化兒童醫療照護計畫協調管理中心，請協助納入核心醫院、重點醫院及幼兒專責醫師制度等計畫之執行工作中，加強推廣。

正本：中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國中醫師公會全國聯合會、社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會、社團法人中華民國牙體技術師公會全國聯合會、中華民國助產師助產士公會全國聯合會、中華民國呼吸治療師公會全國聯合會、中華民國語言治療師公會全國聯合會、社團法人中華民國諮商心理師公會全國聯合會、中華民國營養師公會全國聯合會、中華民國臨床心理師公會全國聯合會、社團法人中華民國職能治療師公會全國聯合會、中華民國醫事放射師公會全國聯合會、中華民國醫事檢驗生公會全國聯合會、社團法人中華民國醫事檢驗師公會全國聯合會、社團法人中華民國物理治療師公會全國聯合會、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、中華民國聽力師公會全國聯合會、中華民國驗光生公會全國聯合會、中華民國驗光師公會全國聯合會、台灣醫院協會、台灣社區醫院協會、中華民國區域醫院協會、台灣醫學中心協會

副本：本部保護服務司、本部心理健康司、財團法人國家衛生研究院（優化兒童醫療照護計畫協調管理中心）

部長 邱泰源

孩子的傷痕 在告訴你什麼？

10分鐘教你辨識兒虐技巧！




身體虐待

精神虐待

疏忽

請點選上方 [受虐型態]
或直接下滑從第一頁開始閱讀

請點擊每個頁面左下角 [◀回總目錄] 可直接跳回到本頁



身體虐待

1

瘀挫傷

／ 懷疑孩童受虐 ／



4歲以下的孩子：
軀幹(Torso)、耳朵
(Ear)、
頸部(Neck)受傷



4個月以下的嬰兒：
任何部位的瘀傷

TEN-4

有以上傷痕要提高警覺，有兒虐的可能性。

身體虐待

1

瘀挫傷

一般人看到瘀傷顏色不同，會認為是不同時間受虐造成，但兒童皮膚緊密程度、顏色、位置、營養狀況不同，都會影響癒合情況，不能單以顏色判斷瘀傷發生時間。



顏色不同

發生時間不同

孩子反覆受傷？

◀回總目錄 ▶回身體虐待類別

身體虐待

1

瘀挫傷

有瘀挫傷不代表受虐，可以從照顧者或孩子對受傷情形的說法來綜合判斷。



孩子在外行為



親子兩方對傷口的說法

◀回總目錄 ▶回身體虐待類別

身體虐待

2

燒燙傷

意外的燒燙傷 /




身體虐待

2

燒燙傷

斑馬紋的燙傷 /



斑馬紋(Zebra striae)是施暴者將孩子壓入熱水中，孩子會反射性蜷曲身體，腹部縐摺處沒有被燙傷，造成皮膚呈現條狀的傷勢。


身體虐待

2

燒燙傷

\ 袖套/襪子式的燙傷 /

受虐的孩子在熱水中掙扎，嘗試站起或撐起身體，造成四肢末端形成袖套/襪子式的燙傷。



掙扎時嘗試站起/撐起身體



袖套式(Glove)



襪子式傷口(Sock)

◀回總目錄 ▶回身體虐待類別

身體虐待


2

燒燙傷


危險物品舉例




熨斗



香菸



電捲棒



界線明顯

形狀規則、同該器物形狀

若施暴者使用香菸、電器等物品施虐，傷口則會呈現規則烙印的形狀，邊緣和正常皮膚會有明顯界線。

◀回總目錄 ▶回身體虐待類別

身體虐待

3

虐待性骨折

虐待性骨折通常沒有明顯外傷，較不易觀察，但可從以下外顯行為判斷。




◀ 回總目錄 ◀ 回身體虐待類別

身體虐待

3

虐待性骨折

醫事人員透過X光片發現兒童後側肋骨、肩胛骨，胸骨、顱骨發生骨折，受虐的可能性較高。





◀ 回總目錄 ◀ 回身體虐待類別

身體虐待


3

虐待性骨折



生長板骨折

大腿螺旋骨折



嬰兒比幼兒更容易發生四肢骨折，例如四肢生長板骨折，或是大腿螺旋骨折。

◀回總目錄 ◀回身體虐待類別

身體虐待


4

受虐性腦傷

- 一般稱為「搖晃嬰兒症」，發生於1歲以下嬰兒。
- 嚴重時，頭部有血腫、前葉和枕葉硬膜下出血、視網膜前有出血等情形。

視網膜前有出血

頭部有血腫



前葉和枕葉硬膜下出血

◀回總目錄 ◀回身體虐待類別

身體虐待

4

受虐性腦傷

- 照顧者受不了孩子哭鬧，劇烈連續的搖晃嬰兒，或是打巴掌、重摔嬰兒，就會造成受虐性腦傷。
- 嬰兒可能出現焦躁不安、嗜睡、嘔吐、痙攣、呼吸中止等症狀。




◀ 回總目錄 ◀ 回身體虐待類別

身體虐待

5

腹部創傷

- 一般發生於2-4歲孩子
- 虐待導致的腹部創傷，可能會造成腹痛、嘔吐、煩躁、瘀挫傷。



◀ 回總目錄 ◀ 回身體虐待類別

身體虐待

6

其他補充

外觀

- 前五項常見的身體虐待可以從外觀判斷。若無明顯外傷，要從其他方面觀察受虐情形。

情緒、行為


- 孩子情緒變得易怒、攻擊性強。
- 孩子會有強烈焦慮感、無法說出原因、行為退縮。

言語

- 有的孩子會直接表達疼痛感。
- 有的孩子會透露照顧者不當的管教方式。



◀回總目錄 ◀回身體虐待類別



請點選上方「精神虐待類別」或直接下滑從第一頁開始閱讀

精神虐待

1

持續性謾罵



\ 持續性謾罵導致兒童—易怒 /

持續被謾罵的孩子，會覺得自己很糟，甚至害怕犯錯。因為大腦中負責處理情緒和壓力的部分變得非常敏感，會發出「有危險」的信號，即使其實沒危險，孩子也容易感到緊張或生氣，變得更容易情緒失控。像這樣長時間處於壓力下，孩子的情緒調節能力會變差，導致遇到小事也會發脾氣。

◀回總目錄 ◀回精神虐待類別

精神虐待

2

羞辱



\ 羞辱導致兒童—低自尊 /

當孩子被羞辱時，會覺得自己不夠好、不值得被喜歡。這種感覺會讓大腦反覆記住負面的話語，孩子會開始相信那些羞辱的話是真的，覺得自己很差，什麼都做不好。這種感覺叫做**低自尊**，覺得自己不值得被愛或尊重。如果這種情況持續，孩子可能變得害怕嘗試新事物，因為他們擔心再被批評或羞辱。

◀回總目錄 ◀回精神虐待類別

精神虐待

3

孤立



\ 孤立導致兒童—憂鬱 /

當孩子被孤立時，會覺得沒有人關心或陪伴，心裡變得沮喪難過，對周遭環境會感到更容易緊張或害怕，不容易調整自己的心情。這種情況可能讓孩子開始覺得自己不被需要或不重要，時間久了會變得不愛說話、沒興趣做平時喜歡的事情，甚至會感到很無助，這就是所謂的憂鬱。

◀回總目錄 ◀回精神虐待類別

精神虐待

4

威脅



\ 威脅導致兒童—過分順應大人 /

孩子長時間生活在被威脅的環境中，為了避免被罵或受罰，他們會學著迎合大人的要求，變得不敢說出自己的想法。他們會認為「只要聽話就不會被罵」，所以努力讓大人高興，甚至忽略自己的感受和需求。久而久之，孩子會失去自信，變得只會依賴別人的指示。


◀回總目錄 ◀回精神虐待類別



\\ 冷漠導致兒童—過度黏人 /

孩子長期生活在一個冷漠的環境裡，得不到父母或照顧者的關心，他們會覺得很不安全，沒有被愛或需要。他們會想一直靠近大人，才會感到安心。這會讓他們更害怕獨處，沒辦法自己處理問題。長期下來，孩子總是需要別人陪伴才能放心。

◀ 回總目錄 ◀ 回精神虐待類別



請點選上方「疏忽類別」或直接下滑從第一頁開始閱讀

疏忽

1

生理方面



疏忽

2

醫療方面

醫療照護不足或疏失，包括忽視孩子的健康需求，例如未按時帶孩子就醫或服藥，特別是對患有慢性病的孩子不提供必要的治療。



疏忽


3

教育方面


影響孩童的教育疏失，包括不讓孩子接受基礎教育，或對孩子的學習缺乏關注，導致學業落後或學習機會缺失，都是需要特別留意小孩是否有受到妥善照顧的徵兆。



孩童受國民義務教育的機會被剝奪



孩童上學經常遲到、缺席、甚至企圖逃學



孩童在學校常常表現出很疲累或無法專注

◀回總目錄 ▶回疏忽類別

疏忽

4

情感方面

疏忽虐待可從孩童與家長或照顧者的「依附關係」進行觀察

·情感關係強烈
·有足夠信任感

生、心理需求
有被理解跟滿足



依附關係安全

對周邊不信任



對孩子缺乏關心或互動，導致孩子感到孤獨或被忽視。

依附關係不安全

◀回總目錄 ▶回疏忽類別

疏忽

4

情感方面

不安全的依附關係

有三種型態，應該進一步觀察孩童是否有受到虐待的可能。

迴避型



孩童看到家長時缺乏反應，代表雙方關係薄弱。

矛盾型



家長對孩童的行為有時親密有時疏離，難以預測。造成孩童不安全感，難以安撫。

混亂型



看到家長時會抗拒或恐懼。

◀回總目錄 ▶回疏忽類別

疏忽

5

監護方面

孩童未獲適當照顧 對心理與生理，產生負面影響



生活起居



健康狀況



情緒需求

照顧者因為忙於工作未妥適照顧孩子，造成孩子生活起居無人照料、健康狀況未能及時察覺，情緒需求未能被理解和滿足。



◀回總目錄 ▶回疏忽類別

疏忽

5

監護方面



外觀

孩童時常挨餓、穿著不合時令、體重過輕、發育遲緩、衛生習慣不佳。

情緒、行為

孩童態度冷漠、喪失興趣、同儕關係惡化、不願意回家

言語

孩童可能會透漏「爸媽好幾天不在家」、「都吃便利商店」、「沒有人洗衣服」，代表照顧者放任孩子獨自生活。

◀回總目錄 ◀回疏忽類別

疏忽

6


其他補充

脆弱性因子

可進一步了解孩童家裡的情形，是否有以下「脆弱因子」，透過通報來獲得協助。



失業 貧窮
犯罪 藥酒癮
精神疾病



◀回總目錄 ◀回疏忽類別